


Protection des semis et des jeunes emblavures

Département Phytopharmacie

Centre wallon de Recherches agronomiques





	<i>Ouest</i>	<i>Centre</i>	<i>Est / Condroz</i>
97-98	30.10.97	30.10.97	-
98-99	-	-	-
99-00	14.10.99	-	-
00-01	-	-	-
01-02	06.11.01	06.11.01	06.11.01
02-03	08.10.02	-	-
03-04	-	-	-
04-05	06.10.04	06.10.04	06.10.04
05-06	11.10.05	11.10.05	11.10.05
06-07	13.10.06	13.10.06	13.10.06
07-08	09.10.07	09.10.07	09.10.07




1967 :
8.000 ha

1983 :
100.000 ha

2007 :
220.000 ha





Traitement de semences GauchO Orge

- *Facilité*
- *Confort*

Surveillance + pulvérisation(s) si nécessaire

- *Ajustement aux besoins*
- *+ de surveillance*
- *Moindre coût*
- *Moins d'impact sur milieu*

Sécurité de la protection




Gaucha Orge assurance tout-risque ?





Vérifiez les doses
de Gaucho Orge !

Conservez un
échantillon de
semences !



Désherbage des céréales : grands principes

ESCOURGEON

Désherber **AVANT** l'hiver

Lutte >< les dicotylées Lutte >< les graminées

Raisonner à la parcelle

HEROLD et MALIBU sont les plus efficaces
Voir résultats d'essais dans le Livre blanc

Vérifier l'efficacité des traitements à la sortie d'hiver



FROMENT

Désherber **APRES** l'hiver

Désherbage d'automne peut se justifier si :

- semis précoce (suivi d'un automne doux et prolongé)
- travail du sol simplifié avant le semis
- présence d'adventices résistantes
- d'échec ou d'absence de désherbage dans la culture précédente



Plus d'informations dans le Livre Blanc de septembre 2008.

Agréation des produits phytopharmaceutiques

*Plus aucun produit
agrée contre les
taupins en céréales*

Des bactéries pour protéger les plantes ?

*CERALL agrée en froment contre carie,
septoriose et fusariose.*

*Suspension *Pseudomonas chlororaphis**

