

Informations scientifiques



Alouette des champs Ph. © L. Barbier/ONCFS

54
Yves Ferrand

Alouette, fragile alouette

Les régions agricoles de la moitié nord de notre territoire constituent les foyers de reproduction les plus importants pour l'alouette des champs, aussi la mise en place de nouveaux contrats territoriaux d'exploitation pourrait-elle assurer un statut de conservation favorable à l'espèce.

Promenades perturbatrices

Des premières études démontrent que les randonneurs et leurs chiens peuvent être source de perturbation - on dit de dérangement - pour la faune sauvage. A quand le guide de bonne conduite !

Miettes de hiboux

Quand le garde-manger du Grand Duc finissait dans celui de l'Homme !

Le lynx et l'agneau

Il est nécessaire de prendre en compte la prédation du félin sur les troupeaux domestiques lors de réintroduction.

Photos de couverture :
Haut : Huitrier pie Ph. © Ph. Massil/ONCFS;
Milieu : Sarcelles d'hiver Ph. © L. Barbier/ONCFS;
Bas : Grands cormorans Ph. © L. Barbier/ONCFS

Gestion des espèces



Chevalier guillemette Ph. © E. Midoux/ONCFS

24

L'hivernage des limicoles sur le littoral français

Roger Mahéo
François Gabillard

Le bilan des comptages de limicoles effectués depuis 1996 confirme l'importance du littoral français pour l'hivernage de ces oiseaux et la conservation de certaines des espèces. Le point sur les principaux limicoles de nos régions côtières.



Grèbe huppé Ph. © M. Bernier/ONCFS

44

Les oiseaux piscivores en Dombes

Joël Broyer
Patrice Labbé
Patrick Varagnat

Comment ces prédateurs que sont le grand cormoran, le héron cendré et le grèbe huppé fréquentent-ils les étangs de la Dombes et de ses environs? L'approche de leur distribution peut-elle aider à l'évaluation de leur impact sur la pisciculture ou sur l'efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer celle-ci.



La passée Ph. © L. Barbier/ONCFS

14

La chasse du gibier d'eau après la loi du 26 juillet 2000

Annie Charlez

La chasse des espèces migratrices s'inscrit désormais dans le contexte de l'Union Européenne. Depuis la directive de 1979, la chasse du gibier d'eau en France a subi de nombreuses remises en question. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Point de vue

2

Les oiseaux migrateurs européens

Jean-Marie Boutin

Leur gestion dans le contexte de la directive 79-409 Oiseaux et la mise en place des plans de gestion pour certaines espèces. Ces derniers soulignent deux points importants :

- le contrôle et l'évaluation du plan de conservation des espèces d'oiseaux susceptibles d'être chassées ;
- la collecte et les comptes-rendus des données qualitatives des prélèvements à la chasse.



Vanneau huppé Ph. © A. Roobrouck/ONCFS

Chasse & gestion



Canaud Pilet Ph. © A. Roobrouck/ONCFS

6

La chasse des anatidés et carnet de prélèvement

Jean-Luc Baglinière
Vincent Schricke

La nouvelle loi sur la chasse stipule que pour la chasse de nuit des oiseaux d'eau un carnet de prélèvement doit être tenu pour chaque poste fixe : hutteau, hutte, tonne ou gabion.

Le travail précurseur présenté ici met en évidence l'importance que revêt le dépouillement des informations fournies par des tels carnets pour la gestion des populations d'anatidés. Cette analyse concerne douze années de chasse dans un gabion de la baie du Mont Saint Michel, de 1983-1984 à 1994-1995.



Bécasseau variable Ph. © Ph. Massil/ONCFS